

兔熱病是一種非常嚴重的疾病，是由一種偶爾在老鼠、兔子和其他野生動物體內發現的細菌引起的。

兔熱病是怎樣感染的？

以下情況可能會導致感染兔熱病：

- 處理被感染的死亡動物，
- 被受感染的壁虱、鹿虻或其他昆蟲叮咬，
- 進食或飲用被污染的食物或水，或
- 吸入引發兔熱病的細菌。

兔熱病危險嗎？

危險。必須**立即**用特效抗生素治療，否則可能會導致死亡。經過抗生素治療後，可能會脫離危險。



兔熱病有哪些症狀？

潛伏期通常為3-5天：

- 突然發燒、寒顫，
- 腺體腫脹、疼痛，
- 頭痛，
- 腹瀉，
- 肌肉和關節疼痛，
- 乾咳，
- 虛弱。

感染程度不同，症狀也不同。可能發生皮膚或口腔疼痛、喉嚨疼痛、眼睛或頸部、腋下或腹股溝的腺體腫脹疼痛。

隨後可能感染肺炎、呼吸短促、胸痛和咳血。有些人可能會停止呼吸而死亡。

兔熱病會傳染嗎？

不會。人與人之間不會傳染兔熱病。

有疫苗嗎？

沒有。

如果我認為自己感染了兔熱病怎麼辦？

立即打電話給醫生或醫院。



如何預防被感染？

可以採取以下預防措施：

- 防止昆蟲叮咬，
 - 在皮膚上使用含有DEET的殺蟲劑，
 - 在衣服上噴灑含有百滅寧（permethrin）的驅蟲劑。
- 經常用肥皂和溫水洗手，尤其是在處理死亡動物後，
- 食物必須徹底煮熟，
- 確保水源安全。

如果家畜或寵物（尤其是兔、鼠和其他齧齒動物）出現發燒、重量減輕、腺體腫大、疼痛等異常症狀時，立即打電話給獸醫。

恐怖分子可能會把兔熱病作為一種武器嗎？

有可能，但是很難向空氣中釋放足夠的兔熱病病菌。

更多資訊……

請致電 CDC (Centers for Disease Control) 獲得英語資訊：

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

或瀏覽：www.bt.cdc.gov/agent/tularemia
www.dhs.ca.gov/epo